

Upotreba

Novalac AR je hrana za posebne medicinske potrebe sa dodatim kukuruznim škrobom. Prilagođena je posebnim prehranbenim potrebama dojenčeta sa problemom bljućkanja od rođenja do 6. mjeseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlijekom. Novalac AR zadovoljava sve prehranbene potrebe dojenčeta do 6. mjeseca starosti, a po savjetu ljekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 mjeseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savjetu ljekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumijeva 7 mjerica mlijeka na 210 ml vode.

Nakon 12 mjeseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3 Junior, mlijeko nakon dojenja, pogodno za ishranu male djece.

Važno upozorenje

Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra i davati samo dojenčadi koja pokazuju simptome kojima je proizvod namijenjen. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad do 6. mjeseca starosti. Nije za parenteralnu primjenu. Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Novalac AR se može koristiti samo na osnovu savjeta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalaca AR potreban je kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na bjelčevine mlijeka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na boćicu pazite da kontakt između mlijeka i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon posljednjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6
Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4
Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7
Količina vode (ml)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g Novalaca AR. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako ljekar drugačije ne savjetuje, poštućte preporuke iz tablice.

- Uvijek pripremite svjež obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od svjetlosti.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma utisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj iskoristite u roku od 3 sedmice.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Serijski broj i rok trajanja su utisnuti na dnu limenke. Pakovano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal – Njemačka.
Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG; uvezeno iz Slovenije.
Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmet Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH |
Broj rješenja o upisu u Registar RS:
Broj i datum rješenja u FBiH:

MEDIS | www.novalac.ba



od rođenja do 6. mjeseca starosti

400 g e

Novalac

Mlijeko za dojenčad
Hrana za posebne medicinske potrebe

Dijetetski proizvod
Za dijetalnu ishranu dojenčadi sa bljućkanjem

AR



Novalac

Hranljiva vrijednost

	100 g	100 ml	100 kcal
Energetska vrijednost			
	kJ	2121,6	275,8
	kcal	506,7	65,9
Masti			
- od toga zasićene	g	25,5	3,3
- od toga mononezasićene	g	12,4	1,6
- od toga polinezasićene	g	6,5	0,8
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,8	0,6
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	470	61,1
Ugljikohidrati			
- od toga šećeri	g	57,3	2,4
- od toga šećeri	g	48,1	6,3
Bjelčevine			
Sol	g	12,0	1,6
	g	0,375	0,05
Vitamini			
A	µg RE	450	58,5
B1	µg	400	52
B2	µg	800	104
B6	µg	300	39
B12	µg	1,5	0,2
C	mg	60	7,8
D3	µg	7,5	1
E	mg α-TE	12,8	1,7
K1	µg	30	3,9
Niacin	mg	4,5	0,6
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3
Folna kiselina	µg	60	7,8
Biotin	µg	15	2
Minerali			
Natrij	mg	150	19,5
Kalij	mg	625	81,3
Hlorid	mg	375	48,8
Kalcij	mg	500	65
Fosfor	mg	365	47,5
Magnezij	mg	45	5,9
Željezo	mg	6	0,8
Cink	mg	4,5	0,6
Jod	µg	95	12,4
Bakar	µg	400	52
Mangan	µg	35	4,6
Selen	µg	10	1,3
Fluorid	µg	<450	<59
Kolin	mg	60	7,8
Inozitol	mg	25	3,3
Taurin	mg	44	5,7
L-karnitin	mg	8	1

Osmolarnost: 253 mOsm/L

Ne sadrži gluten. Sadrži mlijeko i soju.

Sastojci

Obrano mlijeko, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kukuruzni škrob, emulgator (sojin lecitin), vitamini (retinilat, tiaminijev hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, L-askorbinska kiselina, hloekalciferol, α-tokoferilat, fitomenadion, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotenat), trikalcijev fosfat, taurin, kolin bitartarat, željezo (II) sulfat, natrijev hlorid, cinkov sulfat, antioksidant (ekstrakt bogat tokoferolima), L-karnitin, magnezijev oksid, inozitol, bakar (II) sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputstvo za pripremu 100 ml obroka



PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.



1 Boćicu i poklopac sa cuclom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokriivenoj posudi. Neka ključa barem 5 minuta.



3 Vodu u posudi ohladite do 40°C i prelijte 90 ml u boćicu.



4 Dodajte u boćicu 3 poravnate mjerice praha (12,9 g).



5 Boćicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastopi.



6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.