

Upotreba

Novalac 3 prelazno mleko za odojčad pogodno za ishranu male dece sa dodatim vitaminima i mineralima prilagođeno je posebnim prehrambenim potrebama dece uzrasta od 1. do 3. godine. Jedan pripremljen obrok sadrži: kalcijum i vitamin D (doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju dece), gvožđe (doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji dece) i jod (doprinosi normalnom rastu dece). Novalac 3 pogodan je za nastavak ishrane nakon upotrebe mleka Novalac 2 ili nekog drugog prelaznog mleka za odojčad. Ima prijatan ukus vanile. *Novalac 3 mljeko nakon dojenja sa dodatim vitaminima i mineralima namnjenjen je maloj djeci od 1. do 3. godine. Jedan pripremljen obrok sadrži: kalcij i vitamin D (doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju u djece) i jod (doprinosi normalnom rastu djece). Novalac 3 pogodan je za nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalaca 2 ili neke druge prijelazne mlijecne hrane. Ima dobar okus vanilije.*

Doziranje

Vašem detetu možete dati toplo (< 37 °C) ili hladno mleko Novalac 3, koje se može upotrebiti i za pripremu kaša od žitarica i ostalih obroka kao deo uravnotežene ishrane. Jedna limenka od 400 g dovoljna je za pripremu 11 obroka. Priprema u flašici: na svakih 30 mL vode dodajte jednu mericu Novalac-a 3. Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,5 g Novalac-a 3. Za 100 mL obroka sipajte u flašicu 3 poravnate merice praha (13,5 g). Priprema u čaši: U 240 mL vode dodajte 8 merica Novalac-a 3. *Vašemu djetetu možete dati topao (< 37 °C) ili hladan napitak Novalac 3, ili ga upotrijebiti i za pripremu dječjih žitarica i ostalih obroka kao dio uravnotežene prehrane. Jedna limenka od 400 g dovoljna je za pripremu 11 obroka. Priprema u bočici: Za svakih 30 ml vode dodajte jednu mjericu Novalaca 3. Jedna mjerica sadrži 4,5 g praha. Za 100 ml obroka uspite u bočicu 3 poravnate mjerice praha (13,5 g). Priprema u čaši: U 240 ml vode dodajte 8 mjerica Novalaca 3.*

Važne napomene

Novalac 3 namenjen je deci uzrasta od 1. do 3. godine. Novalac 3 deo je mešovite ishrane koja se u prvih dvanaest meseci ne sme koristiti kao zamena za majčino mleko. Molimo Vas da povedete računa o raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani Vašeg deteta. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre šest meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta.

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok. / *Uvijek pripremite sveži obrok.*
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti. / *Čuvajte na suhom i hladnom mestu, zaštićeno od svetla.*
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje. / *Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.*
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. / *Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.*
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite. / *Ne čuvajte nepijeni obrok. Ostatak bacite.*

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu ambalaže. / *Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otnisnog na dnu limenke.*

Serijski broj je utisnut na dnu ambalaže. Ne sadrži gluten. Sadrži **mleko i soju**.
Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / *Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal, Nemačka; **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz:** Slovenije
Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija; **Uvoznici za Republiku Srbiju:** PHOENIX PHARMA d.o.o., Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijejski Bulevar 3, 11000 Beograd; **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 23964/2023 od 26.12.2023. godine | **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. **Uvoznik za BiH:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG; Uvezeno iz Slovenije.

Broj i datum rješenja u FBiH: 04-33-2759-22-DP od 10.6.2022.
Broj rješenja u upisu u Registar RS: 11/08-500.4-283/22 od 11.11.2022



Novalac

3

RS: Prelazno mleko za odojčad pogodno za ishranu male dece

BA: Mlijeko nakon dojenja za malu djecu

Dijetetski proizvod



SA UKUSOM VANILE
SA OKUSOM VANILJJE

od **1-3** godine

Neto koli ina: **400 g** e

Nutritivne informacije / Hranjiva vrijednost				
	100 g	100 ml	%RV* / %PU*	
Energetska vrednost / Hranjiva vrijednost	kJ	1990	269	/
	kcal	474	64	/
Masti	g	19	2,6	/
- od toga zasićene	g	7,6	1	/
- od toga nezasićene				
- od toga linolna kiselina	g	4,4	0,6	/
- od toga alfa-linolenska kiselina	mg	530	72	/
Ugljeni hidrati / Ugjikohidrati	g	64,4	8,7	/
- od toga šećeri	g	38,2	5,2	/
Proteini / Bjelančevine	g	11	1,5	/
So / Sol	g	0,325	0,04	/
Vitamini				
Vitamin A	µg	540	73	18
Vitamin D3	µg	8,5	1,1	16
Vitamin E	mg	4	0,5	10
Vitamin K1	µg	30	4,1	34
Vitamin C	mg	60	8,1	18
Tiamin	mg	0,6	0,08	16
Riboflavin	mg	1	0,14	20
Niacin	mg	6	0,8	11
Vitamin B6	mg	0,7	0,09	13
Folna kiselina	µg	120	16	21
Vitamin B12	µg	2	0,3	38
Biotin	µg	20	2,7	27
Pantotenska kiselina	mg	2,5	0,3	10
Minerali				
Kalcijum / Kalcij	mg	650	88	16
Fosfor	mg	385	52	9
Magnezijum / Magnezij	mg	45	6,1	8
Gvožđe / Željezo	mg	9,5	1,3	16
Cink	mg	4	0,5	10
Bakar	mg	0,35	0,05	10
Mangan	mg	0,035	0,005	0,4
Jod	µg	100	14	18

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos)

UPOZORENJE: Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.
Novalac 3 možete upotrijebiti kao dodatak za pripremu mlijecnih obroka.

Sastojci

Delimično obrano **mleko**, maltodekstrin, laktoza (**mleko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, ulje uljane repice), fruktoza, deksstroza, trikalcijum-citrat, trikalcijum-fosfat, vitamini [L-askorbinska kiselina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-alfa-tokoferilacetat (vitamin E), kalcijum-D-pantotemat, riboflavin (vitamin B2), tiamin-hidrohlodid, retinil-acetat (vitamin A), piridoksin-hidrohlodid (vitamin B6), pteroilmonoglutaminska kiselina (folna kiselina), D-biotin, fitomenadon (vitamin K), holekalciferol (vitamin D), cijanokobalamin (vitamin B12)], etil-vanilin, gvožđe (II)-sulfat, magnezijum-oksidi, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar (II)-sulfat, kalijum-jodid, mangan-sulfat.
Djelomično obrano mlijeko, maltodekstrini, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, ulje uljane repice), fruktoza, deksstroza, trikalcijev citrat, trikalcijev fosfat, vitamini [askorbinska kiselina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-a-tokoferol acetat (vitamin E), kalcijev-D-pantotemat, riboflavin (vitamin B2), tiamin hidroklorid, retinil acetat (vitamin A), piridoksin hidroklorid (vitamin B6), folna kiselina, D-biotin, fitomenadon (vitamin K), kolekalciferol (vitamin D), cijanokobalamin (vitamin B12)], etil-vanilin, željezov sulfat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

- PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.**
- 1** Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajete u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / *Očistite bočicu i dudu koju ćete upotrijebiti te sterilizirajte u kipućoj vodi 5 minuta.*
- 2** Vodu za pripremu obroka prokuvajete u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / *Vodu za pripremu obroka prokuhajte. Neka ključa bar 5 minuta.*
- 3** Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / *Vodu u lončicu ohladite na 40 °C i preljeite je u bočicu.*
- 4** Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / *Uspite u bočicu ili čašu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.*
- 5** Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / *Zatvorite bočicu za bebe plastičnim poklopcem i dobro promućkajte odnosno promiješajte dok se prašak potpuno ne otopi u vodi.*
- 6** Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / *Provjerite temperaturu (37 °C) na unutarnjoj strani zapešća dok ne osjetite ni toplo ni hladno.*