

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Upotreba

Pogodno za posebnu djetetsku namenu za odojčad od rođenja kada se ne doje ili se dohranjuju. Novalac AC početno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta sa količina od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac AC zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 ml vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece. / Novalac AC je hrana za posebne medicinske potrebe sa sniženim sadržajem laktoze. Prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama dojenčeta sa problemom kolika od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac AC zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 ml vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, mleko nakon dojenja, pogodno za ishranu male dece.

Važne napomene

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad do 6. meseca starosti. Nije za parenteralnu upotrebu. Dojenje je najbolji način ishrane za decu do šest meseci starosti. Mleko Novalac AC se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac AC potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude preduj ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadnjeg noćnog obroka. / Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad do 6. meseca starosti. Nije za parenteralnu primenu. Dojenje je najbolji način ishrane za dojenčad do šest meseci starosti. Novalac AC se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalaca AC potreban je kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude preduj ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6	>6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	7	8	9	>9,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj merica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7	7
Količina vode (ml)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210	210

*kao deo mešovitne ishrane / *kao dio raznolikih prehrane
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca AC. Jednu mericu rastvorite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštujujte preporuke iz tablice. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca AC. Jednu mericu rastvorite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, uvažite preporuke iz tablice.

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok. - Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti. - Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje. - Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. - Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskoristili. Ostatok bacite. / - Uvek pripremite svež obrok. - Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti. - Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj iskoristite u roku od 3 sedmice. - Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. - Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatok bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Sadržaj mleko i soju. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heenerer str 49, 39576 Stendal, Nemačka | **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz:** Slovenije | **Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravstva RS:** Medis Pharma d.o.o., Beograd, Milutina Mikavicića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija | **Uvoznici za Republiku Srbiju:** Phoenix Pharma d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; Vega d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirjevski bulevar 3, 11000 Beograd | **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravstva RS:** 3066/2023 od 04.04.2023. godine / **Proizvođač:** UP INDUSTRIES, Heenerer str. 49, 39576 Stendal - Njemačka, | Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz:** Slovenije | **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmetina Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH | **Uvoznik za BiH:** Hergenzvinnig d.o.o., Muje Pašića 6, 88000 Mostar, Tekslova 0361 501 500. **Broj rešenja o upisu u Registar Republike Srbije:** 11/08-500-4-138/25 od 08.04.2025 | **Broj i datum rešenja u FBiH:** 04-33-3747/20-OP od 29.3.2021



MEDIS | www.novalacs.rs
www.novalac.ba

Novalac AC

RS: Početno mleko za potrebe ishrane kod odojčadi sa kolikama
Hrana za posebne medicinske namene
Dijetetski proizvod

BA: Mlijeko za dojenčad
Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu ishranu
dojenčadi sa kolikama



od rođenja do 6. meseca / meseca starosti

Neto količina:
400 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 ml	%RV* / %PU* 100 mL
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	KJ	2119,9	273,6
	kcal	506,3	65,8
Masti	g	25,5	3,3
- od toga zasićene	g	12,4	1,6
- od toga nezasićene	g	6,5	0,8
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,7	0,6
- od toga α-linoleinska kiselina (ω-3)	mg	460	59,8
Ugljeni hidrati / Ugljiko hidrati	g	58,2	7,6
- od toga šećeri	g	23,1	3
Proteini / Bjelancevine	g	11	1,4
So / Sol	g	0,375	0,05
Vitamins			
Vitamin A	µg RE	450	58,5
Vitamin B1	µg	400	52
Vitamin B2	µg	800	104
Vitamin B6	µg	300	39
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	60	7,8
Vitamin D3	µg	7,5	1
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7
Vitamin K1	µg	30	3,9
Niacin	mg	4,5	0,6
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3
Folna kiselina	µg	60	7,8
Biotin	µg	15	2
Minerali			
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5
Kalijum / Kalij	mg	450	58,5
Hloridi / Kloridi	mg	300	39
Kalcijum / Kalcij	mg	350	45,8
Fosfor	mg	230	29,9
Magnezijum / Magnezij	mg	45	5,9
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8
Cink	mg	4,5	0,6
Jod	µg	65	8,5
Bakar	µg	400	52
Mangan	µg	35	4,6
Selen	µg	10	1,3
Fluoridi	µg	<500	<65
Ostalo			
Holin / Kolín	mg	60	7,8
Inozitol	mg	25	3,3
Taurin	mg	44	5,7
L-karnitin	mg	8	1

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos)
Osmolalitet: 208 mOsm/L

Sastojci

Obrano mleko, maltodekstrini, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktoza (mleko), mlečne belančevine (mleko), kalcijum-hlorid, kalcijum-hidroksid, emulgator (sojini lecitini), vitamini (retinilacetat, tiamin-hidrochlorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrochlorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat, natrijum-hlorid, dikalijum-fosfat, taurin, magnezijum-oksidi, gvožđe-sulfat, holin-bitartrat, cink-sulfat, inozitol, L-karnitin, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, mangan-sulfat, kalcijum-jodid, natrijum-selenit. / Obrano mleko, maltodekstrini, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktoza, mlečne belančevine (mleko), kalcijev hlorid, kalcijev hidroksid, emulgator (sojin lecitin), vitamini (retinilacetat, tiaminjev hidrochlorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinjev hidrochlorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotemat, natrijev hlorid, dikalijev fosfat, taurin, magnezijev oksid, željezo sulfat, kolín bitartrat, cinkov sulfat, inozitol, L-karnitin, antioksidanti (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, manganov sulfat, kalcijev jodid, natrijev selenit.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.

1. Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac sa dušom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 5 minuta.
2. Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa barem 5 minuta.
3. Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u posudi ohladite do 40 °C i prelijte je u bočicu.
4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Dodajte u bočicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice.
5. Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastopi.
6. Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

UPOZORENJE
Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.