

GLUE AREA ZONE

M - Tin size 250/350/400g 99x123,5 - Offset Label size 323,8x115

Please respect strictly the below instructions.

Check the color separation (no cyan and no black allowed) as below:

- Magenta + Yellow + PMS 288 C + ????

The file must be restituted in Illustrator CC with separated layers as provided.

The layout must be added on the middle layer named "Artwork".

Please do not touch the two locked layers named "Specifi" and "BG" to avoid any technical issue.

After checking all the layout, please save the 3 files as below:

- File Illustrator CC (.ai) < with open text and all the links included
- File Illustrator CC (.eps) < with all the text vectorized
- File Acrobat (.pdf) < in low resolution (only for a quick preview of the provided layout)

Please save the above files into a zipped folder before upload on our FTP address.

Thank you in advance for your understanding and your support.

Upotreba

Novalac 2 prelazno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehrabnim potrebama odojčeta nakon 6. meseca starosti. Deo je mešovite ishrane koja se u prvih šest meseci ne sme koristiti kao zamena za majčino mleko. Preporučuje se kao dohrana ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalac 1 početnog mleka za odojčad. Novalac 2 je izvor kalcijuma i vitamina D, koji su neophodni za normalan rast i razvoj kostiju kod dece. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre šest meseci starosti, može biti donesena samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac 2 deo je široke linije proizvoda posebno prilagođenih da zadovolje prehrabne potrebe odojčeta. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece.

Novalac 2 mleko nakon dojenja primenjeno je za posebne prehrabne potrebe za dojenčad nakon 6. meseca starosti. Dio je raznovidne prehrane koja se u prvih šest meseci ne smije koristiti kao nadomestak za majčino mleko. Primjenjen je kao dopuna hrani ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon uporabe mleka za dojenčad. Novalac 2 je izvor kalcija i vitamina D, koji su potrebni za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Odluka o započinjanju dopunske prehrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske prehrane i pre šest meseci starosti, može biti donesena samo na temelju savjeta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Novalac 2 dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljenje prehrabnih potreba dojenčadi. Nakon 12 mjeseci starosti preporučamo prijelaz na Novalac 3, mlijeko nakon dojenja.

Važne napomene

Majčino mleko je najbolja hrana za odojče. Mleko Novalac za ishranu odojčeta koristi se samo na osnovu preporuke stručnjaka iz oblasti medicine, ishrane, farmacije ili druge stručne osobe nezavisne od proizvođača hrane, odgovorne za zdravlje majke i deteta, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba Vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadnjeg noćnog obroka. Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Mleko se koristi samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i deteta. Poseban oprez pri uporabi mleka Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	> 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	> 7,5
Broj obroka na dan / Broj obroka na dan	3*
Broj merica za pripr. jednog obroka / Broj mjerica za pripr. jednog obroka	7
Količina vode (mL) / Količina vode (mL)	210

* kao deo mešovite ishrane / kao dio raznovidne prehrane

Napomene

Uvek pripremite svež obrok.

Cuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.

Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.

Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.

Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite.

Uvijek pripremite sveži obrok.

Cuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.

Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 nedelja.

Nakon svake uporabe limenku dobro zatvorite.

Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebite do: rok trajanja je utisnut na dva ambalaže. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Ne sadrži gluten. Sadržaj mleko i soju. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakovano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. Zemlja porekla: Nemačka. DE ST 00217 EG. Uvoznici iz Slovenije: Novalac upisa u bazu podataka. Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Uvoznici za Srbiju: PHOENIX PHARMA d.o.o. Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijevski Bulevar 3, 11000 Beograd. Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Uvoznik za BiH: Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG.

MEDIS

www.novalac.rs
www.novalac.ba

30161063

1507M301

3 831061 014876

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

2

RS: Prelazno mleko za odojčad
Dijetetski proizvod
BA: Mlijeko nakon dojenja
Dijetetski proizvod

Neto količina:
400 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 ml	% RY* % PU*	
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ 2075,2	209,8	/	
Masti	g 23	3	/	
- od toga zasićene	g 11,1	1,4	/	
- od toga mononezasićene	g 5,9	0,8	/	
- od toga polinezasićene	g 4,8	0,6	/	
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g 4,3	0,6	/	
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	g 0,42	0,0546	/	
Ugijjeni hidrati / Ugjikohidrati	g 61	7,9	/	
- od toga šećeri	g 42,1	5,5	/	
Proteini / Bjelancevine	g 11	1,4	/	
So / Sol	g 0,375	0,05	/	
Vitamins	µg RE	450	58,5	
Vitamin A	µg	400	52	
Vitamin B1	µg	800	104	
Vitamin B2	µg	300	39	
Vitamin B6	µg	1,5	0,2	
Vitamin B12	µg	60	7,8	
Vitamin C	µg	8,1	1,1	
Vitamin D3	µg	8,7	1,1	
Vitamin E	mg α-TE	30	3,9	
Vitamin K1	µg	4,5	0,6	
Niacin	mg	2,4	0,3	
Pantotenska kiselina	µg	60	7,8	
Folna kiselina	µg	15	2	
Biotin	µg	150	19,5	
Minerali	mg	620	80,6	
Natrijum / Natrij	mg	415	54	
Kalijum / Kalij	mg	635	82,6	
Hloridi / Klorid	mg	360	46,8	
Kalcijum / Kalcij	mg	45	5,9	
Fosfor	mg	6	0,8	
Magnezijum / Magnezij	mg	4,5	0,6	
Gvožđe / Željezo	µg	95	12,4	
Cink	µg	400	52	
Jod	µg	35	4,6	
Bakar	µg	10	1,3	
Mangan	µg	<450	<59	
Selen	µg	60	7,8	
Fluorid	mg	60	7,8	
Ostale	Holin / Kolin	mg	60	7,8

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos)

UPOZORENJE Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštete zdravlje deteta.

Broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 2349/2023 od 12.04.2023. godine. Broj rješenja u upisu u Registar Republike Srbije: 11/08-500/4-155/25 od 08.04.2025.

Broj i datum rješenja u FBiH: 04-33-7525/22-DP od 25.08.2023

Sastojci

Obrano mleko, maltodekstrini, laktoza (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijum-karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalijum-hidroksid, kalcijum-hlorid, trikalcijum-fosfat, vitamini (retinilacetat, tiamin-hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotenat, natrijum-hlorid, holin-bitarat, gvožđe-sulfat, L-tryptofan, trikalijum-citrat, magnezijum-oksidi, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, kalijum-jodid, mangan-sulfat, natrijum-selenit.

Obrano mleko, maltodekstrini, laktoza (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalijev hidroksid, kalcijev klorid, trikalcijev fosfat, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, L-askorbinska kiselina, kolekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotenat), natrijev klorid, kolin bitartrat, željezov sulfat, L-tryptofan, trikalijev citrat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

1

Flašicu i poklopac sa sudom prokuvajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s duhom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.

2

Vodu za pripremu obroka prokuvajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončicu. Neka ključa bar 5 minuta.

3

Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončicu ohladite na 40 °C i prelijte je u bočicu.

4

Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.

5

Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.

6

Pripremljeni obrok ohladite do mlagog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlagog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.