

Upotreba

Novalac 2 prelazno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehrambenim potrebama odojčeta nakon 6. meseca starosti. Deo je mešovite ishrane koja se u prvih šest meseci ne sme koristiti kao zamena za majčino mleko. Preporučuje se kao dohrana ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalac 1 početnog mleka za odojčad. Novalac 2 je izvor kalcijuma i vitamina D, koji su neophodni za normalan rast i razvoj kostiju kod dece. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i prve šest meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nevisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac 2 deo je široke linije proizvoda posebno prilagođenih da zadovolje prehrambene potrebe odojčeta. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece.

Novalac 2 mleko nakon dojenja primenjeno je za posebne prehrambene potrebe za odojčad nakon 6. meseca starosti. Dio je raznolike prehrane koja se u prvih šest meseci ne sme koristiti kao zamena za majčino mleko. Preporučuje se kao dohrana hrane ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon upotrebe mleka za odojčad. Novalac 2 je izvor kalcijuma i vitamina D, koji su potrebni za normalan rast i razvoj kostiju kod dece. Odluka o započinjanju dopunske prehrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske prehrane i prve šest meseci starosti, može biti donesena samo na temelju saveta zdravstvenih radnika nevisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Novalac 2 deo je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljenje prehrambenih potreba dojenčeta. Nakon 12 meseci starosti preporučamo prelazak na Novalac 3, mleko nakon dojenja.

Važne napomene

Majčino mleko je najbolja hrana za odojče. Mleko Novalac za ishranu odojčeta koristi se samo na osnovu preporuke stručnjaka iz oblasti medicine, ishrane, farmacije ili druge stručne osobe nezavisne od proizvođača hrane, odgovore za zdravlje majke i deteta, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac: potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba Vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadržeg noćnog obroka.

Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Mleko se koristi samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i deteta. Poseban oprez pri upotrebi mleka Novalac: potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mlečnu belančevinu. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadržeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mesece)	> 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	> 7,5
Broj obroka na dan / Broj obroka na dan	3*
Broj merica za pripr. jednog obroka / Broj merica za pripr. jednog obroka	7
Količina vode (mL) / Količina vode (mL)	210

* kao deo mešovite ishrane / kao dio raznolike prehrane

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorističen. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu ambalaže. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Sadržaj mleka i soju. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakovano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. Zemlja porekla: Nemačka. DE ST 00217 EG. Uvezeno iz Slovenije. Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Uvoznici za Srbiju: PHOENIX PHARMA d.o.o. Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bora Bogojavljevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirnijski Bulevar 3, 11000 Beograd. Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmet Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Uvoznik za BiH: Hercegovinalijek d.o.o. Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj. DE ST 00217 EG.

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca 2. Jednu mericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštujujte preporuke iz tablice.

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca 2. Jednu mericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.

- Uvek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od svjetla.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte neprijemni obrok. Ostatak bacite.


Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu ambalaže. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Sadržaj mleka i soju. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakovano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. Zemlja porekla: Nemačka. DE ST 00217 EG. Uvezeno iz Slovenije. Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Uvoznici za Srbiju: PHOENIX PHARMA d.o.o. Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bora Bogojavljevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirnijski Bulevar 3, 11000 Beograd. Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmet Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Uvoznik za BiH: Hercegovinalijek d.o.o. Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj. DE ST 00217 EG.

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba

od 6-12 meseca /
mjeseca starosti

RS: Prelazno mleko za odojčad
Dijetetski proizvod
BA: Mlijeko nakon dojenja
Dijetetski proizvod



Neto količina:
400 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 ml	% RV* / % PU*
Energetska vrednost	2075,2	269,8	/
Energetska vrijednost	kcal	495	64,4
Masti	g	22,3	3
- od toga zasićene	g	11,1	1,4
- od toga mononezasićene	g	5,9	0,8
- od toga polinezasićene	g	4,8	0,6
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,3	0,6
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	g	0,42	0,0546
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	61	7,9
- od toga šećeri	g	42,1	5,5
Proteini / Bjelancevine	g	11	1,4
So / Sol	g	0,375	0,05
Vitamins	µg RE	450	58,5
Vitamin A	µg	400	32
Vitamin B1	µg	800	104
Vitamin B2	µg	300	39
Vitamin B6	µg	1,5	0,2
Vitamin B12	µg	60	7,8
Vitamin C	µg	8,7	1,1
Vitamin D3	mg α-TE	8,7	1,1
Vitamin E	mg α-TE	30	3,9
Vitamin K1	µg	45	0,6
Niacin	mg	2,4	0,3
Pantotenska kiselina	mg	60	7,8
Folna kiselina	µg	15	2
Biotin	µg	150	19,5
Minerali	mg	620	80,6
Natrijum / Natrij	mg	415	54
Kalijum / Kalij	mg	635	82,6
Hloridi / Klorid	mg	360	46,8
Kalcijum / Kalcij	mg	45	5,9
Fosfor	mg	6	0,8
Magnezijum / Magnezij	mg	45	0,6
Gvožđe / Željezo	mg	95	12,4
Cink	µg	400	52
Jod	µg	35	4,6
Bakar	µg	10	1,3
Mangan	µg	<450	<5,9
Selen	µg	60	7,8
Fluorid	mg		
Ostalo			
Holin / Kolín	mg		

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos) / UPOZORENJE: Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.

Broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 2349/2023 od 12.04.2023. godine. Broj rešenja o upisu u Registar Republike Srpske: 11/08-500.4-155/25 od 08.04.2025. Broj i datum rešenja u FBiH: 04-33-7525/22-OP od 25.08.2023

Sastojci

Obrano mleko, maltodekstrini, laktoza (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijum-karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalcijum-hidroksid, kalcijum-florid, trikalcijum-fosfat, vitamini (retinilacetat, tamin-hidroksid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroksid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat, natrijum-hlorid, holin-bitarbit, gvožđe-sulfat, L-triptofan, trikalcijum-citrat, magnezijum-oksidi, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, kalcijum-jodid, mangan-sulfat, natrijum-selenit.

Obrano mleko, maltodekstrini, laktoza (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijum-karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalcijum-hidroksid, kalcijum-florid, trikalcijum-fosfat, vitamini (retinilacetat, tamin-hidroksid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroksid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat, natrijum-hlorid, kolín-bitarbit, željezo-sulfat, L-triptofan, trikalcijum-citrat, magnezijum-oksidi, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, kalcijum-jodid, mangan-sulfat, natrijum-selenit.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE

1. Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s čudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.

2. Vodu za pripremu obroka prokuvajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.

3. Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i preljetite je u bočicu.

4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.

5. Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.

6. Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.