

Upotreba

Pogodno za posebnu djetetsku namenu za odojčad od rođenja kada se ne doje ili se dohranjuju. Novalac AR početno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta sa problemom bljuvkanja od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac AR zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece. / Novalac AR je hrana za posebne medicinske potrebe sa dodatim kukuruznim škrobom. Prilagođena je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta sa problemom bljuvkanja od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac AR zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3 Junior, mleko nakon dojenja, pogodno za ishranu male dece.

Važne napomene

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad do 6. meseca starosti. Nije za parenteralnu primenu. Dojenje je najbolji način ishrane za decu do šest meseci starosti. Mleko Novalac AR se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac AR potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude preduj ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka. / Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad do 6. meseca starosti. Nije za parenteralnu primenu. Dojenje je najbolji način ishrane za odojčad do šest meseci starosti. Novalac AR se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalac AR potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude preduj ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon poslednjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6	>6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5	>7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj merica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7	7
Količina vode (mL)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210	210

*kao deo mešovite ishrane / *kao dio raznolike prehrane

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca AR. Jednu mericu rastvorite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalac AR. Jednu mericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, uvažite preporuke iz tablice.

Napomene

• Uvek pripremite svež obrok. • Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti. • Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskoristi. Ostatak bacite. / • Uvijek pripremite svež obrok. • Čuvajte na suhom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj iskoristite u roku od 3 sedmice. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. | Zemlja porekla: Nemačka. DE ST 00217 EG; Uvezeno iz: Slovenije. | Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. | Uvoznici za Republiku Srbiju: Phoenix Pharma d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; Vega d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirjevićki bulevar 3, 11000 Beograd. | Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: 4445/2023 od 01.10.2023. godine. / Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal – Njemačka. | Proizvedeno u Njemačkoj. DE ST 00217 EG; Uvezeno iz: Slovenije. | Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmet Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH. | Uvoznik za BA: Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Broj rešenja o upisu u Registar Republike Srpske: 11/08-500-4-136/25 od 08.04.2025. | Broj i datum rešenja u FBiH: 04-33-7593/25-DP od 31.03.2026.

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba



NOVALAC AR

RS: Početno mleko za odojčad sa problemom bljuvkanja (anti-regurgitaciona formula)

Hrana za posebne medicinske namene
Dijetetski proizvod

BA: Mlijeko za dojenčad
Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu ishranu
dojenčadi sa bljuvkanjem



od rođenja do **6. meseca / mjeseca starosti**

Neto količina:
400 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 mL	%RVT* %PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ 2121,6	275,8	/
	kcal 506,7	65,9	/
Masti	g 25,5	3,3	/
- od toga zasićene masne kiseline	g 12,4	1,6	/
- od toga mononezasićene masne kiseline	g 6,5	0,8	/
- od toga polinezasićene masne kiseline	g 5,3	0,7	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g 4,8	0,6	/
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg 470	61,1	/
Ugljeni hidrati / Ugljici hidrati	g 57,3	7,4	/
- od toga šećeri	g 48,1	6,3	/
Proteini / Bjelancevine	g 12,0	1,6	/
Sa / Sol	g 0,375	0,05	/
Vitamins			
Vitamin A	µg RE	450	58,5
Vitamin B1	µg	400	52
Vitamin B2	µg	800	104
Vitamin B6	µg	300	39
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	60	7,8
Vitamin D3	µg	7,5	1
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7
Vitamin K1	µg	30	3,9
Niacin	mg	4,5	0,6
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3
Folna kiselina	µg	60	7,8
Biotin	µg	15	2
Minerali			
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5
Kalijum / Kalj	mg	625	81,3
Hloridi / Klorid	mg	375	48,8
Kalcijum / Kalcij	mg	500	65
Fosfor	mg	365	47,5
Magnezijum / Magnezij	mg	45	5,9
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8
Cink	mg	4,5	0,6
Jod	µg	95	12,4
Bakar	µg	400	52
Mangan	µg	35	4,6
Selen	µg	10	1,3
Fluoridi	µg	<450	<59
Ostalo			
Holin / Koln	mg	60	7,8
Inozitol	mg	25	3,3
Taurin	mg	44	5,7
L-karnitin	mg	8	1

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad

*PU (preporučeni unos)

Osmolalitet: 260 mOsm/L

Sastojci

Obrano mleko, laktoza (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kukuruzni škrob, emulgator (sojin lecitin), vitamini (retinilatet, tiamin-hidrohlid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilatet, fitomenadon, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat, trikalcijum-fosfat, taurin, holin-bitartrat, gvožđe(II)-sulfat, natrijum-hlorid, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), L-karnitin, magnezijum-oksidi, inozitol, bakar(II)-sulfat, natrijum-selenit, kalijum-jodid, mangan-sulfat. / Obrano mlijeko, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kukuruzni škrob, emulgator (sojin lecitin), vitamini (retinilatet, tiaminjev hidrohlid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinjev hidrohlid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilatet, fitomenadon, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotemat), trikalijev fosfat, taurin, kolon bitartrat, željezo (II) sulfat, natrijev hlorid, cinkov sulfat, antioksidant (ekstrakt bogat tokoferolima), L-karnitin, magnezijev oksid, inozitol, bakar (II) sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.



Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 5 minuta.



Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivnoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivnoj posudi. Neka ključa barem 5 minuta.



Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u posudi ohladite do 40 °C i prelijte je u bočicu.



Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Dodajte u bočicu preporučeni broj mjerica pomoću priložene mjerice.



Flašicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno rastopi. / Bočicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno rastopi.



Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

UPOZORENJE

Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.