

Upotreba

Pogodno za posebnu djetetsku namenu za dojenje kada se ne doje ili se dohranjuju. Novalac IT početno mlekto za odojčad prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta sa zatvorom od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekotom. Novalac IT zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelaz na Novalac 3, prelazno mlekto pogodno za ishranu male dece. / *Novalac IT je hrana za posebne medicinske potrebe, koja sadrži laktazu kao jedini ugljikohidrat. Prilagođena je posebnim prehranbenim potrebama dojenčeta sa problemom zatvora od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekotom. Novalac IT zadovoljava sve prehranbene potrebe dojenčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, mlekto nakon dojenja, pogodno za ishranu male dece.*

Važne napomene

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad do 6. meseca starosti. Dojenje je najbolji način ishrane za decu do šest meseci starosti. Mleko Novalac IT se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka za odojčad Novalac IT potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenci niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Nije za parenteralnu primenu. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka. / *Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad do 6. meseca starosti. Dojenje je najbolji način ishrane za dojenčad do šest meseci starosti. Novalac IT se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalaca IT potreban je kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenci niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Nije za parenteralnu primenu. Kod hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.*

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)		0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6	>6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)		4	5	6	6,5	7	7,5	>7,5
Broj obroka na dan		6 do 7	5	5	5	4	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj merica za pripremu jednog obroka		3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7	7
Količina vode (mL)		90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210	210

*kao deo mesovite ishrane / *kao dio raznolike prehrane

Do viha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca IT. Jednu mericu rastvorite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice. / *Do viha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca IT. Jednu mericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, uvažite preporuke iz tablice.*

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / *Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

- Uvijek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatok bacite.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str 49, 39576 Stendal, Nemačka | **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG; **Uvezeno iz:** Slovenije | **Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravstva RS:** Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija | **Uvoznici za Republiku Srbiju:** PHOENIX PHARMA d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijevski Bulevar 3, 11000 Beograd | **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravstva RS:** 6291/2025 od 26.01.2025. godine


Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str 49, 39576 Stendal – Njemačka, | **Proizvedeno u:** Njemačkoj, DE ST 00217 EG; **Uvezeno iz:** Slovenije | **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH | **Uvoznik za BA:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pasića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. | **Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srpske:** 11/08-500-4-133/25 od 04.04.2025 | **Broj i datum rješenja u FBiH:** 04-33-7592/25-DP od 25.03.2026.

MEDIS | www.novalac.rs | www.novalac.ba

Novalac IT

RS: Početno mlekto za potrebe ishrane kod odojčadi sa zatvorom
Hrana za posebne medicinske namene
Dijetetski proizvod

BA: Mlijeko za dojenčad
Hrana za posebne medicinske potrebe
Za djetalnu ishranu
dojenčadi sa zatvorom



Neto količina:
400 g e
od rođenja do **6. meseca / mjeseca starosti**

Nutritivne informacije

		100 g	100 ml	% RV* / % PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ / kcal	2122,9	276	/
Masti	g	25,5	63,3	/
- od toga zasićene masne kiseline	g	12,4	1,6	/
- od toga mononezasićene masne kiseline	g	6,5	0,8	/
- od toga polinezasićene masne kiseline	g	5,3	0,7	/
- od toga linolna kiseline (ω-6)	g	4,7	0,6	/
- od toga α-linolnske kiseline (ω-3)	mg	460	59,8	/
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	58,2	7,6	/
- od toga šećeri	g	58,2	7,6	/
Proteini / Bjelancevine	g	11	1,4	/
Sa / Sol	g	0,375	0,05	/
Vitamini				
Vitamin A	µg RE	450	58,5	15
Vitamin B1	µg	400	52	10
Vitamin B2	µg	800	104	15
Vitamin B6	µg	300	39	6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2	25
Vitamin C	mg	60	7,8	17
Vitamin D3	µg	7,5	1	14
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7	34
Vitamin K1	µg	30	3,9	33
Niacin	mg	4,5	0,6	9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3	10
Folna kiselina	µg	60	7,8	6
Biotin	µg	15	2	20
Minerali				
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5	5
Kalijum / Kalij	mg	450	58,5	6
Hloridi / Klorid	mg	310	40,3	8
Kalcijum / Kalcij	mg	390	50,7	9
Fosfor	mg	200	26	5
Magnezijum / Magnezij	mg	65	8,5	11
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8	10
Cink	mg	4,5	0,6	12
Jod	µg	65	8,5	11
Bakar	µg	400	52	10
Mangan	µg	35	4,6	0,4
Selen	µg	10	1,3	7
Fluoridi	µg	<450	<59	/
Hrom / Krom	µg	<50	<7	/
Molibden	µg	<50	<7	/
Ostalo				
Holin / Kolin	mg	100	13	/
Inozitol	mg	45	5,9	/
Taurin	mg	44	5,7	/
L-karnitin	mg	8	1	/

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos) Osmolarnost: 316 mOsm/L

Sastojci

Obrano mlekto, mlečne belančevine (mleko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktaza (mleko), kalcijum-hlorid, emulgator (soja lecitin), trikalcijum-citrat, vitamini (retinilacetat, tiamin-hidrohlod, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlod, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadion, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantonat), trikalcijum-citrat, natrijum-citrat, magnezijum-oksidi, taurin, gvožđe (II)-sulfat, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, natrijum-selenit, L-karnitin, kalcijum-jodid, inozitol, mangan-sulfat, holin bitartarat. / *Obrano mlekto, mlečne belančevine, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktaza, kalcijev hlorid, emulgator (sojin lecitin), trikalcijev citrat, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidrohlod, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidrohlod, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadion, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantonat), trikalcijev citrat, trinatrijev citrat, magnezijev oksid, taurin, željezov sulfat, cinkov sulfat, antioksidanti (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, natrijev selenit, L-karnitin, kalijev jodid, inozitol, manganov sulfat, holin bitartarat.*

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU



1. Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac sa dšudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.



2. Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3. Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijte je u bočicu.



4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj merica pomoću priložene merice.



5. Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.



6. Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osettite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osettite ni hladno ni toplo.

UPOZORENJE
Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.