

Upotreba

Novalac 1 početno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac 1 deo je široke linije proizvoda posebno prilagođenih da zadovolje prehranbene potrebe odojčeta. Posle 6 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 2, prelazno mleko za odojčad.

Novalac 1 mlijeko za dojenčad primjereno je za posebne prehranbene potrebe za hranjenje dojenčadi od rođenja do 6. mjeseca starosti, ako majka ne doji. Novalac 1 dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljenje prehranbenih potreba dojenčadi. Nakon 6 mjeseci starosti preporučamo prijelaz na Novalac 2, mlijeko nakon dojenja.

Važne napomene

Majčino mleko je najbolja hrana za odojčad. Mleko Novalac se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Mlijeko Novalac se može koristiti samo na temelju savjeta zdravstvenih radnika neovisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez pri upotrebi mlijeka Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mlijeka i zuba vašega djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje						
Starost odojčeta (meseći) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5
Broj obroka na dan / Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4
Br. merica za pripravu jednog obroka / Br. mjerica za pripravu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7
Količina vode (mL) / Količina vode (mL)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca 1. Jednu mericu rastvorite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice.

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca 1. Jednu mjericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.

- Napomene**

 - Uvek pripremite svjež obrok.
 - Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
 - Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
 - Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
 - Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorisćen. Ostatak bacite.
- Uvijek pripremite svježi obrok.
 - Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od svetla.
 - Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
 - Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
 - Ne čuvajte nepijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranu atmosferu.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz:** Slovenije. **Posilac upisa u bazu podataka dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja RS:** Medis Pharma d.o.o, Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. **Uvoznik iz Srbije:** Phoenix Pharma d.o.o., Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, VESCA d.o.o., Valjevo, Dr Bore Stanković 30, 14000 Valjevo, Farmalogist d.o.o., Mirjevski bulevar 3, 11000 Beograd. **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmet Muratbegović 2, 71000 Sarajevo, BiH. **Uvoznik za BiH:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG.

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba

30161838
1506M301




od rođenja do **6.** meseca/
mjeseca starosti

Novalac

1

RS: Početno mleko za odojčad
Dijetetski proizvod
BA: Mlijeko za dojenčad
Dijetetski proizvod



Neto količina:
400 g

Nutritivne informacije			
	100 g	100 ml	% RV* / % PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kcal / kJ	505,3 / 2115,7	65,7 / 275 /
Masti	g	25,5	3,3 /
- od toga zasićene	g	12,4	1,6 /
- od toga mononezasićene	g	6,5	0,8 /
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7 /
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,7	0,6 /
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	460	59,8 /
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	57,8	7,5 /
- od toga šećeri	g	41,1	5,3 /
Proteini / Bjelancevine	g	11	1,4 /
So / Sol	g	0,375	0,05 /
Vitameni			
Vitamin A	µg RE	450	58,5 15
Vitamin B1	mg	0,4	0,052 10
Vitamin B2	mg	0,8	0,104 15
Vitamin B6	mg	0,3	0,039 6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2 25
Vitamin C	mg	60	7,8 17
Vitamin D3	µg	7,5	1 14
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7 34
Vitamin K1	µg	30	3,9 32,5
Niacin	mg	4,5	0,6 9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3 10
Folna kiselina	µg	60	7,8 10
Biotin	µg	15	2 20
Minerali			
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5 5
Kalijum / Kalij	mg	470	61,6 6
Hloridi / Klorid	mg	300	39 8
Kalcijum / Kalcij	mg	380	49,4 9
Fosfor	mg	230	29,9 5
Magnezijum / Magnezij	mg	45	5,9 7
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8 10
Cink	mg	4,5	0,6 12
Jod	µg	65	8,5 11
Bakar	mg	0,4	0,052 10
Mangan	mg	0,035	0,0046 0,38
Selen	µg	10	1,3 6,5
Fluorid	mg	<0,45	<0,059 /
Ostalo			
Holin / Kolina	mg	100	13 /
Inozitol	mg	45	5,9 /
Taurin	mg	44	5,7 /
L-karnitin	mg	8	1 /

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos)
UPOZORENJE: Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštettite zdravlje deteta.

Sastojci

Obrano **mleko**, **mlečne** belančevine (**mleko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), maltodekstrini, trikalcijum-citrat, emulgator (**sojin** lecitin), vitamini (retinilatetat, holkalciferol, DL-α-tokoferilatetat, fitomenadiol, tiamin-hidrohlorid, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, cijanokobalamin, kalcijum-D-pantotemat), kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, taurin, gvožđe (II)-sulfat, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), magnezijum-oksidi, natrijum-selenit, bakar (II)-sulfat, L-karnitin, kalijum-jodid, mangan-sulfat, holin-bitartrat, dinatrijum-fosfat, inozitol.

Obrano **mlijeko**, **mliječne** bjelancevine, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), maltodekstrini, trikalcijev citrat, emulgator (**sojin** lecitin), vitamini (retinilatetat, holkalciferol, DL-α-tokoferilatetat, fitomenadiol, tiaminijev hidroklorid, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, cijanokobalamin, L-askorbinska kiselina, nikotinamid, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalcijev-D-pantotemat), kalcijev klorid, kalijev klorid, natrijev klorid, taurin, željezov (II) sulfat, cinkov sulfat, antioksidansi: ekstrakt bogat tokoferolima, magnezijev oksid, natrijev selenit, bakrov (II) sulfat, L-karnitin, kalijev jodid, manganolv sulfat, kolina bitartrat, dinatrijev fosfat, inozitol.

- Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka**
- PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU**
1. Flašicu i poklopac sa suclo prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
2. Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
3. Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijte je u bočicu.
4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
5. Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
6. Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osettite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osettite ni hladno ni toplo.

Broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 8265/2026 od 03.02.2026. Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srpske: 11/08-5004-154/25 od 08.04.2025. Broj i datum rješenje u FBiH: 04-33-7524/22-DP od 21.08.2023