

Novalac Allernova AR je hrana za posebne medicinske namene. To je zgusnuta hrana koja sadrži hidrolizovane belančevine iz kraljević mlika (kazein), primerena za odojčad i malu decu koja su preosetljiva na belančevine kraljević mlika povezanu ili ne sa regurgitacijom. Novalac Allernova AR je primerena za odojčad i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti, ukoliko majka ne doji. Novalac Allernova AR zadovoljava sve prehrabne potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti kao deo mešovite ishrane. Novalac Allernova AR sadrži jedinstvenu smesu za zgusnjavanje koja kombinuje skroba i prehrabna vlakna. Ne uvodite u ishranu svog deteta druge mlečne obroke (odjeće cerealijske sa mlekom, mlečne proizvode) bez prethodnog savetovanja sa lekarom. / **Novalac Allernova AR je hrana za posebne medicinske potrebe. To je zgusnuta hrana koja sadrži hidrolizovane belančevine iz kraljević mlika (kazein) te je primljena za dojenčad i malu decu preosetljivu na belančevine kraljević mlika povezanu ili ne sa regurgitacijom. Novalac Allernova AR primljena je za dojenčad i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti ako majka ne doji. Novalac Allernova AR zadovoljava sve prehrabne potrebe dojenčeta do 6. meseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 meseci vreme preporuka lekara može da je raznolik prehrane. Novalac Allernova AR sadrži jedinstvenu smesu za zgusnjavanje koja kombinuje skroba i prehrabna vlakna. Ne uvodite u prehranu svog deteta druge mlečne obroke (odjeće žitarice sa mlekom, mlečne proizvode) bez prethodnog savetovanja sa lekarom.**

Važna napomena

Dojenje je najbolji način ishrane za odojčad do šest meseci starosti. Novalac Allernova AR se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Novalac Allernova AR je pogodan za posebnu dijetetsku namenu za odojčad od rođenja do 6. meseca starosti kada se ne doje ili se dohranjuje. Novalac Allernova AR je pogodan za posebnu dijetetsku namenu za odojčad stariju od 6 meseci i može da predstavlja deo raznovidne ishrane, ne može da se koristi kao zamena za majčino mleko u prvih 6 meseci života, a odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre 6 meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac Allernova AR se ne sme primenjivati u slučaju malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Proizvod nije primenjen za parenteralnu upotrebu ili za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonočadi i novorođenčadi niske porođajne težine. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude preduj ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube deteta nakon poslednjeg noćnog obroka. / **Mogućno mleko najbolje je hrana za dojenčad. Novalac Allernova AR se mora uzimati pod nadzorom lekara. Proizvod nije primenjen za uzimanje kao jedinu izvor prehrane nakon 6. meseca starosti. Novalac Allernova AR se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Novalac Allernova AR ne smeje primenjivati u slučaju malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Proizvod nije primenjen za parenteralnu upotrebu. Novalac Allernova AR nije prikladna za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonočadi i novorođenčadi niske porođajne mase. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Prilikom hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mlečne hrane i zuba vašeg deteta ne bude dugotrajn ili učestao jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.**

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mesece)	0 do 1	1 do 2	2 do 4	4 do 6	6 do 12	12 do 36
Broj obroka na dan	6	5	5	4	3*	2 do 3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj merica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7	7	8
Količina vode (mL)	90	120	150	210	210	240

*kao deo mešovite ishrane / *kao dio raznolike prehrane

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,5 g Novalaca Allernova AR. Jednu mericu rastvoriti u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice. / **Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,5 g Novalaca Allernova AR. Jednu mericu rastopiti u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice.**

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskoristio. Ostatak bacite.
- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 sedmice.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti dok rok trajanja je istisnut na dnu limenke. Serijski broj je istisnut na dnu limenke. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / **Pakirano u kontrolisanoj atmosferi.**

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. **Zemlja porekla:** Nemačka, DE. **ST 00217 EG: Uvozeno iz Slovenije. Novalac dozvoljava za upotrebu bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. **Uvoznik za Republiku Srbiju:** Phoenix Pharma d.o.o., Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, Vega d.o.o. Valjevo, Dr Bore Bлагословиća 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirjevićev bulevar 3, 11000 Beograd | **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 6286/2025 od 26.01.2025. **/ Proizvođač:** UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal – Njemačka. **Zemlja porijekla:** Njemačka, DE. **ST 00217 EG: Uvozeno iz Slovenije. / Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmetina Muševićeva 2, 71000 Sarajevo, BiH. **/ Uvoznik za BA:** Hecogedintinjek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500.**

Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srbije: 11/08-504-5/26 od 22.1.2026
Broj i datum rješenja u FBiH: 04-33-0020-26-DP od 13.4.2026

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba

3 831061 015422

Novalac Allernova AR

RS: Hrana za posebne medicinske namene - Dijetetski proizvod

Za potrebe ishrane odojčadi i male dece koja su preosetljiva

na belančevine kraljević mlika sa regurgitacijom

BA: Hrana za posebne medicinske potrebe - Dijetetski proizvod

Za djetalnu prehranu dojenčadi i male djece
preosetljive na bjelančevine kraljević
mlijeke te koja imaju regurgitaciju



Neto količina:

400 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 mL	%RV**
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	2106 kcal	284 / 68	/
Masti	26,2	3,5	/
- od toga zasićene masne kiseline	g 10,2	1,4	/
- od toga monone zasićene masne kiseline	g 9,3	1,3	/
- od toga polinezasićene masne kiseline	g 5,4	0,7	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g 4,7	0,6	/
- od toga α-linoleinska kiselina (ω-3)	mg 430	58,1	/
- od toga ARA arahidonska kiselina	mg 10	1,3	/
- od toga DHA dokosaheksaemska kiselina	mg 120	16,2	/
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	53,5	7,2	/
od toga šećeri	g 4,7	0,6	/
Vlakna	2	0,3	/
Proteini / Bjelancevine	12,1	1,6	/
So **	0,45	0,06	/

Vitamin A	µg RE	440	59,4	15
Vitamin B1	µg	800	108	22
Vitamin B2	µg	1200	162	23
Vitamin B6	µg	600	81	12
Vitamin B12	µg	1,5	0,25	25
Vitamin C	mg	60	8,1	18
Vitamin D3	µg	12	1,6	23
Vitamin E	mg α-TE	8,7	1,2	24
Vitamin K1	µg	38	4,1	34
Niacin	mg	4,5	0,6	9
Pantotenska kiselina	mg	5	0,7	23
Folna kiselina	µg	100	13,5	11
Biotin	µg	15	2	20
Minerali				
Natrijum / Natrij	mg	180	24,3	6
Kalijum / Kalj	mg	610	82,4	8
Hloridi	mg	400	54	11
Kalijum / Kalci	mg	575	77,6	14
Fosfor	mg	330	44,6	8
Magnezijum / Magnezij	mg	50	6,8	9
Gvožđe / Željezo	mg	5,4	0,7	9
Cink	mg	3,5	0,5	10
Jod	µg	100	13,5	17
Bakar	µg	380	51,3	10
Mangan	µg	38	6,8	0,6
Selen	µg	12	3	15
Fluorid	µg	<450	<61	/
Hrom	µg	<45	<7	/
Molibden	µg	<45	<7	/
Ostalo				
Holin	mg	170	23	/
Inozitol	mg	80	10,8	/
Taurin	mg	40	5,4	/
L-karnitin	mg	20	2,7	/

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanu formulu za odojčad (podatak za Republiku Srbiju)

** Podatak za Republiku Srbiju

Doslovac: 214 i 0,06 g/L

UPOZORENJE: Novalac Allernova AR je zgusnuta formula koja je potrebno pre upotrebe mlađati duže nego što je to uobičajeno. Zbog posebnog sastava izgled, miris i ukus u flašici mogu biti drugačiji u odnosu na standardno mleko. Bez ikakvih posledica za vašu bebu, zgusnuta mlečna formula Novalac Allernova AR može prirodno da sadrži nešto belih grudica prehrabnih vlakana. Takođe može biti varak i nešto mekše (ili zelenkaste stolicke, bez ikakvih nelagodnosti za odojčad). Ako se obrat ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikuje da oštećite zdravlje deteta. / **Novalac Allernova AR je zgusnuta formula koja čete prije upotrebe trebati mlađati duže nego što je to uobičajeno. Zbog posebnog sastava izgled, miris i ukus u bočici mogu biti drugačiji u odnosu na standardno mleko. Bez ikakvih posledica za vašu bebu, zgusnuta formula Novalac Allernova AR može prirodno sadržavati neke bijele ogledine prehrabnih vlakana. Može prouzročiti i nešto manje tvrde i/ili zelenkaste stolicke bez nelagodnosti za dojenčad.**

Sastojci

Maltodekstrin, biljna ulja (palmino, ulje uljane repice, sunčokretovo, kokosovo), hidrolizovane mlečne belančevine, zgusnjivači (pektin, ksantan guma, guma iz semena rogača), skroba, tipokse, dikalcijum-fosfat, emulgator (sunčokretov lecitin), trikalcijum-citrat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, holin-bitartat, ulje mikroalge *Schizochytrium sp.* (DHA), L-cistin, vitamini (retinil-acetat, tamnin-hidrohlod, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlod, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokofenolat, fitomenadion, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat), L-tryptofan, inozitol, gvođe(III)-pirofosfat, ulje *Mortierella alpina* (ARA), dikalcijum-fosfat, trikalcijum-citrat, taurin, L-histidin, L-fenilalanin, L-karnitin, L-cistin, L-izoleucin, trimetilglicin, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokerolima, askorbil-palmitat), natrijum-selenit, bakar-sulfat, kalcijum-jodid, mangano-sulfat, / **Maltodekstrin, biljna ulja (palmino, repičino, sunčokretovo, kokosovo), hidrolizirane bjelančevine iz mlijeke, zgusnjivači (pektin, ksantan guma, guma rogača), skroba tipokse, dikalcijev fosfat, emulgator (sunčokretov lecitin), trikalcijev citrat, kalcijev hlorid, magnezijev hlorid, holin bitartat, ulje mikroalge Schizochytrium sp. (DHA), L-cistin, vitamini (retinilacetat, tamijevih hidrohlod, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidrohlod, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokofenolat, fitomenadion, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev D-pantotemat), L-tryptofan, inozitol, željezov pirofosfat, ulje Mortierella alpina (ARA), dikalcijev fosfat, trikalcijev citrat, taurin, L-histidin, L-fenilalanin, L-karnitin, L-tirozin, L-izoleucin, trimetilglicin, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokerolima, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalcijev jodid, mangano sulfat.**

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE / PRIJE UPOTREBE SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE

1. Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 10 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 10 minuta.

2. Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončicu. Neka ključa barem 5 minuta.

3. Vodu u posudi ohladite do 45 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončicu ohladite do 45 °C i preljeite je u bočicu.

4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj merica pomoću priložene mjerice.

5. Flašicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno otopi.

6. Pripremljeni obrok ohladite do mlađak (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlađak (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.